

PUOI VISIONARE IL REFERTO  
ONLINE O TRAMITE APP



*Scansiona il codice qr  
collegati alla piattaforma oppure scarica l'app*



### **LABORATORIO ANALISI CLINICHE**

Biochimica Clinica - Ematologia e Coagulazione  
Tossicologia - Sieroimmunologia - Allergologia  
Microbiologia e Virologia - Biologia Molecolare

### **POLIAMBULATORIO**

Visite Specialistiche - Diagnostica Strumentale  
Diagnostica Pediatrica

**MULTIMED NETWORK**

Cerca il laboratorio Multimed più vicino a te!  
[www.multimed.it](http://www.multimed.it)



PACCHETTI PREVENZIONE  
**multiCheck**  
**ARTRITE REUMATOIDE**

## L'ESATTA CAUSA DELL'ARTRITE REUMATOIDE NON È NOTA.

L'Artrite Reumatoide è una malattia infiammatoria cronica autoimmune che attacca i tessuti articolari di una persona il cui sistema immunitario, invece di proteggere l'organismo dagli agenti esterni come virus e batteri, si attiva in maniera anomala. L'Artrite Reumatoide colpisce principalmente le piccole articolazioni, come mani e piedi, ma può coinvolgere potenzialmente ogni distretto dell'organismo: in questo caso si parla di malattia sistemica.

La patologia si manifesta con l'infiammazione del tessuto sinoviale, che riveste le articolazioni coinvolte, causando dolore cronico, erosioni ossee, distruzione della cartilagine e perdita, più o meno ampia, dell'integrità articolare. Quando questo si verifica la funzione articolare è compromessa, con conseguente invalidità o disabilità funzionale.

L'Artrite Reumatoide è la più frequente tra le artriti infiammatorie e colpisce circa l'1% della popolazione, in particolar modo le donne. La malattia è infatti tre volte più frequente nelle donne che negli uomini.

In Italia colpisce 300/350mila persone. Ogni anno ci sono circa 4-13 nuovi casi ogni 100.000 uomini e 13-36 nuovi casi ogni 100.000 donne.

L'Artrite Reumatoide può verificarsi a qualsiasi età, ma è più comune tra i 40 e i 70 anni. Il picco di comparsa dei primi sintomi si ha tra i 35 e i 45 anni.

Nel mondo, l'Artrite Reumatoide si sviluppa nell'1% circa della popolazione, indipendentemente dalla razza o dal Paese di origine.



*Avere una diagnosi precoce e iniziare la terapia entro i primi 3-6 mesi dall'esordio della malattia contribuisce a rallentare i processi dannosi*

*Si consiglia di porre attenzione alla comparsa di:*

- DOLORE E GONFIORE
- RIGIDITÀ ARTICOLARE
- DEFORMITÀ ARTICOLARI
- FEBBRE
- PERDITA DI PESO
- SIPOTROFIA MUSCOLARE

### **CHECKUP ARTRITE REUMATOIDE**

Panel di esami per monitorare il sistema immunitario.

Esami eseguiti: VES, FATTORE REUMATORIDE, WAALER ROSE, ANTI CITRULLINA.